

Doporučení francouzské Společnosti anestezie a intenzivní péče: Předintervenční zhodnocení hemostázy

Originální zdroj: Pre-interventional haemostatic assessment: Guidelines from the French Society of Anaesthesia and Intensive Care

Bonhomme, F., Ajzenberg, N., Schved, J. F., Molliex, S., Samama, C. M. for the French: Anaesthetic and Intensive Care Committee on Evaluation of Routine Preoperative Testing. Pre-interventional haemostatic assessment: Guidelines from the French Society of Anaesthesia and Intensive Care *Eur. J. Anaesthesiol.*, 2013, 30, 4, p. 142-162

Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 3, s. 208

Přehled doporučení

1. Riziko krvácení by mělo být posouzeno na základě osobní a rodinné anamnézy a na základě klinického vyšetření.

Stupeň doporučení: Silně doporučeno (Grade 1+)

2. Ke zjištění údajů o přítomnosti hemoragické diatézy u pacienta nebo v jeho rodině by měl být používán standardizovaný dotazník.

Stupeň doporučení: Slabě doporučeno (Grade 2+)

3. Systematické vyšetřování koagulace není vyžadováno u pacientů, kde jejich anamnéza nebo klinické vyšetření nesvědčí pro zvýšené riziko onemocnění spojených s poruchou koagulace, bez ohledu na klasifikaci ASA, povahu výkonu nebo věk (vyjma dětí, které ještě nechodí).

Stupeň doporučení: Silně doporučeno (Grade 1-) ve smyslu tato vyšetření nevyžadovat.

4. Vyšetření koagulace není vyžadováno u pacientů, kde jejich anamnéza nebo klinické vyšetření nesvědčí pro zvýšené riziko onemocnění spojených s poruchou koagulace, bez ohledu na volbu anesteziologické techniky (celková anestezie, centrální nebo periferní nervová blokáda).

Stupeň doporučení: Silně doporučeno (Grade 1-) ve smyslu tato vyšetření nevyžadovat.

5. U pacientů, kde anamnéza svědčí pro zvýšené riziko onemocnění spojených s poruchou koagulace je doporučeno vyšetření specialistou.

Stupeň doporučení: Silně doporučeno (Grade 1+)

6. U dětí, které ještě nechodí by mělo být pravděpodobně provedeno vyšetření APTT a počtu trombocytů s cílem vyloučení vrozené koagulační poruchy (jako je např. hemofilie).

Stupeň doporučení: Pravděpodobně doporučeno nebo mělo by být zváženo (Grade 2+)

7. U dospělých, kde nelze získat anamnestické údaje o přítomnosti hemoragické diatézy od nich samotných nebo v jejich rodinách by mělo být pravděpodobně provedeno vyšetření APTT a počtu trombocytů s cílem vyloučení vrozené nebo získané koagulační poruchy.

Stupeň doporučení: Pravděpodobně doporučeno nebo mělo by být zváženo (Grade 2+).

Adresa pro korespondenci:

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny

Dalhousie University, Dept. of Anesthesia,
Pain Management and Perioperative Medicine,
Halifax, Canada
e-mail: cernyvla1960@gmail.com