

## PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Práce je původní a nebyla publikována ani není zaslána k recenznímu řízení do jiného média.

Autoři prohlašují, že nemají střet zájmů v souvislosti s tématem práce.

Všichni autoři rukopis četli, souhlasí s jeho zněním a zasláním do redakce časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.

Do redakce došlo dne 10. 10. 2016.

Do tisku přijato dne 21. 11. 2016.

Adresa pro korespondenci:

**MUDr. Boris Bilý, PhD.**

e-mail: boris\_bil@yahoo.co.uk

## ZAJÍMAVOSTI, TIPY A TRIKY

### Mnemotechnická pomůcka k zapamatování farmak s vysokým rizikem vzniku periferní neuropatie

MANIC

M = metronidzol

A = amiodaron

N = nitrofurantoin

I = isoniazid

C = cisplatina

PVC

P = phenytoin

V = vincristin/vinblastin

C = ciprofloxacin

### Jsou horší výsledky, když extubuje pacienta noční směna, nebo máme raději čekat do rána na tzv. normální pracovní dobu?

Výskyt reintubace je uváděn vyšší při extubaci po 19:00 hod., ale univerzální odpověď platnou pro všechna pracoviště bez výjimky dát nikdy nepůjde z důvodu odlišného prostředí, odlišného personálního vybavení a zdrojů.

Gershengorn HB, Scales DC, Kramer A, Wunsch H. Association Between Overnight Extubations and Outcomes in the Intensive Care Unit. *JAMA Intern Med.* 2016 Nov 1;176(11):1651–1660.

### Je přítomnost „probublávání vzduchu“ pod hladinou tekutiny ve sběrné nádobě k hrudnímu drénu vždy „dobrá věc“?

Nikoliv, vždy se musíme podívat, v jaké fázi dechového cyklu k „probublávání“ dochází. Pokud dochází k „probublávání“ v obou fázích dechové-

ho cyklu, pak musíme vždy myslet na poruchu těsnosti systému někde mezi hrudním drénem a napojením na odvodný systém. Jak můžeme detekovat poruchu těsnosti? Když na velmi krátkou dobu „zaklampujeme“ hadici napojenou na hrudní drén proximálně (směrem k pacientovi) a „probublávání“ trvá, je příčina v netěsnosti systému mimo pacienta. Pokud dojde k zastavení „probublávání“, je nutno myslet na příčinu úniku vzduchu v hrudníku (nejčastěji bronchopleurální píštěl). Pozor, klamp musí být časově velmi krátký (jen pro diagnostiku situace), jinak hrozí rozvoj tenzního pneumotoraxu.

<http://intensiveblog.com/bubbles-arent-always-good-thing/>

### Jaká je celosvětová mortalita spojená s pořizováním „selfies“?

2014 – 15 úmrtí

2015 – 39 úmrtí

2016 – 73 úmrtí během prvních 8 měsíců

<http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/38012990/the-rise-in-selfie-deaths-and-how-to-stop-them>

Adresa pro korespondenci:

**prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM**

cernyvla1960@gmail.com

inzerce A161007008