

ATESTAČNÍ OTÁZKY OBORU ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

SOUHRN

- Obecně platí, že pro *anesthesia-related outcome* je rozhodující osoba anesteziologa a nikoliv zvolená technika.
- Výsledky studií srovnávající různé techniky anestezie/analgezie pro identické typy operačních výkonů nelze univerzálně extrapolovat.
- Preference pacienta je zásadní faktor při volbě způsobu anestezie.

3. REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

- Literatura na vyžádání u autora článku.

Do redakce došlo dne 3. 2. 2017.

Do tisku přijato dne 5. 2. 2017.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com

Služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle. Na stejnou adresu rovněž zasílejte otázky, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.

ZAJÍMAVOSTI Z LITERATURY

PŘEDOPERAČNĚ PODANÝ PREGABALIN SNIŽUJE VÝSKYT PONV SYNDROMU

GRANT MC, BETZ M, HULSE M, ZORILLA-VACA A, et al. The Effect of Preoperative Pregabalin on Postoperative Nausea and Vomiting: A Meta-analysis. *Anesthesia&Analgesia* 2016; 123; 5: 1100–1107, www.anesthesia-analgesia.org, DOI: 10.1213/ANE0000000000001404

Pregabalin, stejně jako gabapentin, náleží do skupiny gabapentinoidů; na českém trhu je k dispozici jako přípravek Lyrica a Neurontin. Jeho tradiční indikací jsou neuropatické bolesti, je účinný jako antikonvulzivum a přídatně

analgetikum při fibromyalgiích, při diabetické neuropatii a při pooperační kombinované analgetizaci v rámci ERAS, kdy bývá podáván v dávce do 300 mg.

Metaanalýza 23 studií s 1 693 pacienty kromě známých účinků prokázala i významný příznivý vliv na potlačení PONV s RR = 0,53; 95% CI; 0,39–0,73; P = 0,0001. Při posuzování nauzey byly výsledky: RR = 0,62; 95% CI; 0,46–0,83; P = 0,002 a pro pokles výskytu zvracení RR = 0,68; 95% CI, 0,52–0,88; P = 0,003 s trváním účinku 24 hodin. K nežádoucím účinkům se nicméně řadila přechodná pooperační zraková neostrost.

Připravila doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., e-mail: jarmiladrabkova@gmail.com