

JAKÉ LÁTKY ZPŮSOBUJÍ NEJSILNĚJŠÍ ZÁVISLOST?

1. heroin,
2. kokain,
3. nikotin,
4. barbituráty,
5. alkohol.

www.curiosity.com

2018 INFLUENZA ANTIVIRAL RECOMMENDATIONS

NEJVÍCE RIZIKOVÉ SKUPINY:

- těhotné,
- osoby nad 65 let,
- děti pod 2 roky,
- pacienti s chronickými onemocněními (imunosuprese, astma, diabetes mellitus, choroby srdce).

HLAVNÍ VÝCHODISKA A DOPORUČENÍ:

- Časná terapie snižuje tíži průběhu chřipky, zkracuje dobu stonání a redukuje četnost/závažnost komplikací.
- Adekvátní/včasnou antivirovou terapii dostane jen 37 % pacientů s rizikovými faktory.
- Doporučovaná farmaka jsou oseltamivir (orálně), zanamivir (inhalačně) a peramivir (nitrožilně). Všechna jsou účinná proti chřipkovým virům typu A i B.
- Antivirová terapie má být nasazena u rizikových pacientů co nejdříve i při pouhém podezření na chřipku, ideálně do 48 hodin od vzniku příznaků.
- Není doporučeno vyčkávat na laboratorní potvrzení chřipky.

2018 Influenza Antiviral Recommendations – Medscape (www.medscape.com)

NOVÝ LÉK PRO LÉČBU HYPOTENZE U SEPTICKÉHO ŠOKU

Americká FDA schválila angiotensin II (obchodní název Giapreza) pro „léčbu kritického poklesu krevního tlaku u pacientů se septickým/distribučním šokem“. Látka zvyšuje riziko arteriální i žilní trombózy a FDA doporučuje současnou aplikaci postupů profylaxe žilní trombózy.

www.medpagetoday.com

HODNOTA KLIDOVÉ TEPOVÉ FREKVENCE A MORTALITA

Vyšší klidová tepová frekvence je spojena s vyšším rizikem smrti v důsledku kardiovaskulárních chorob, ale i maligních nádorů (karcinom prsu, tlustého střeva a plic). Klidová tepová frekvence může být podle názorů autorů studie považována za nástroj identifikace jedinců s vyšším rizikem smrti.

Heart. 2017;Dec 21. pii: heartjnl-2017-312251. doi: 10.1136/heartjnl-2017-312251.

Do redakce došlo dne 9. 1. 2018.

Do tisku přijato dne 12. 1. 2018.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
cernyvla1960@gmail.com