

NOVÁ DEFINICE HYPERTENZE

American College of Cardiology a American Heart Association definovaly nově prahovou hodnotu pro definici 1. stupně hypertenze: systolický tlak 130-139 mmHg nebo diastolický tlak 80-89 mmHg.

www.medpagetoday.com

VOLBA MÍSTA ZAVEDENÍ PERIFERNÍHO KATÉTRU A JEHO „ŽIVOTNOST“

Při kanylaci periferních žil s využitím ultrazvuku jsou dva faktory, které jsou spojeny s kratší životností katétru *in situ* – délka katétru nad 48 mm a volba žíly, která je v hloubce 1,2 cm nebo více. Nejdelší životnost katétru byla u žil, které byly v hloubce menší než 0,4 cm.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22078967>

JAKÁ MÍSTA HLEDAT PRO ZAVEDENÍ PERIFERNÍHO ŽILNÍHO VSTUPU U DĚTÍ, KDE NENÍ NA PRVNÍ POHLED NIC VIDĚT?

1. Hřbet ruky – oblast mezi 4. a 5. prstem.
2. Kotník – oblast cca 1 prst před mediálním kotníkem.

3. Skalp – pozor na záměnu s arterií.

4. V. jugularis externa.

<http://anaestricks-blog-blog.tumblr.com>

JAK SI ZAPAMATOVAT NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NITROLEBNÍ HYPERTENZE?

THINB

T trauma

H hydrocefalus

I infekce

N neoplasma

B bleeding (krvácení)

<http://www.frca.co.uk>

Do redakce došlo dne 29. 11. 2017.

Do tisku přijato dne 1. 12. 2017.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
cernyvla1960@gmail.com