

APPENDIX C

SEZNAM ČESKÝCH ŠKOLITELŮ
V ECHOKARDIOGRAFII REGISTROVANÝCH ESICM
(2016–2017)

- doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC, ESC TTE accreditation, EDEC examiner, *martin.balik@vfn.cz*
- MUDr. Michal Lipš, EACTA TEE accreditation, *richal.lips@vfn.cz*
- MUDr. Jan Rulíšek, EACTA TEE accreditation, *jan.rulisek@vfn.cz*
- doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D., EACTA TEE accreditation, *jan.kunstyr@vfn.cz*
- MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., EDIC, EACTA TEE accreditation, *richal.porizka@vfn.cz*
- MUDr. Michal Matias, EACTA TEE accreditation, *richal.matias@vfn.cz*
- MUDr. Petr Kopecký, EACTA TEE accreditation, *petr.kopecky@vfn.cz*; *kopcecek@gmail.com*
- MUDr. František Mošna, DESA, EACTA TEE accreditation, *fmosna@seznam.cz*
- MUDr. Petr Plášil, EACTA TEE accreditation, *peta.plasil@seznam.cz*
- MUDr. Tomáš Tencer, EDIC, EACTA TEE accreditation, *tencer_tomas@yahoo.com*

- MUDr. Tomáš Mráz, EACTA TEE accreditation, *tomas.mraz@homolka.cz*
- MUDr. Jiří Roith, EACTA TEE accreditation, *j.roith@seznam.cz*
- MUDr. Petr Kramář, EACTA TEE accreditation, *petr.kramar@ikem.cz*

Práce je původní, nebyla publikována ani není zaslána k recenznímu řízení do jiného média.

Autor prohlašuje, že nemá střet zájmů v souvislosti s tématem práce.

Práce popisující zkušební a edukační materiál k EDEC vznikla s grantovou podporou EU – projekt reg. No. CZ.2.16/3.1.00/21565 OP Prague Competitiveness.

Do redakce došlo dne 9. 1. 2018.

Do tisku přijato dne 25. 1. 2018.

Adresa pro korespondenci:

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
martin.balik@vfn.cz

ZAJÍMAVOSTI Z LITERATURY

Srovnání validity SOFA, qSOFA a SIRS v predikci MOF a mortality u septických pacientů v zemích se středním HDP

Khwannimit B, Bhurayanontachai R, Vattanavanit V. Comparison of the performance of SOFA, qSOFA and SIRS for predicting mortality and organ failure among sepsis patients admitted to the intensive care unit in a middle-income country. *J Crit Care.* 2018;44:156–160.

Srovnávací studie podle 10leté retrospektivní studie z jednotek intenzivní péče v Thajsku u 2350 septických pacientů podle definice Sepsis-2 s mortalitou 44,5 % prokazuje, že qSOFA má průkaznější

prognostickou přesnost pro MOF a mortalitu do 28. dne než SIRS. SIRS > 2 ukazuje sice aktuální závažnost, ale postrádá výtěžnost pro konečný výsledek. SOFA s užitím balíčku Sepsis-3 se považuje statisticky za nejpřínosnější.

Srovnávané údaje: SOFA-AUC = 0,839; qSOFA-AUC = 0,814; $p = 0,003$; SIRS-AUC = 0,587; $p < 0,001$; SIRS-AUC = 0,587; $p < 0,0001$.

Připravila doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
e-mail: jarmiladrabkova@gmail.com