

JAK SI PACIENTI PŘEDSTAVUJÍ, ABY BYL JEJICH LÉKAŘ OBLEČENÝ?

V dotazníkové studii 4 000 pacientů převažuje názor, že pacienti preferují, aby byl jejich lékař oblečen „business attire“ s bílým pláštěm, nebo aspoň v operačním/JIP oblečení „scrubs“ s bílým pláštěm.

<https://labblog.uofmhealth.org/rounds/what-doctors-wear-really-does-matter-to-patients?>

JAKÝ JE OPTIMÁLNÍ KREVŇÍ TLAK PO TROMBEKTOMII PRO ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODU?

Jako optimální hodnota systolického krevního tlaku se jeví 135 mmHg. S každým zvýšením o 10 mmHg se zvyšuje riziko špatného klinického výsledku o 13 %. S každým snížením o 10 mmHg se zvyšuje riziko špatného klinického výsledku o 6 %.

4th European Stroke Organisation Conference 2018. Large Clinical Trials 2. Presented May 18, 2018.

HYPERTENZE JE SPOJENA S VYŠŠÍM RIZIKEM DEMENCE V POZDĚJŠÍM VĚKU

Na souboru téměř 9 000 pacientů s hypertenzí byl analyzován výskyt demence. Systolický tlak nad 130 mmHg ve věku 50 let zvyšuje riziko rozvoje demence v pozdějším věku nezávisle na přítomnosti jiných rizik pro vznik kardiovaskulárních onemocnění.

Association between systolic blood pressure and dementia in the Whitehall II cohort study: role of age, duration, and threshold used to define hypertension, European Heart Journal, ehy288, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy288>

ROZDÍLY HODNOT PULZNÍ OXYMETRIE MEZI PRSTEM A UŠNÍM BOLTCEM

Rozdíly mezi hodnotami pulzní oxymetrie (SpO_2) mezi prstem a ušním boltcem mohou dosahovat až 7 %, autoři doporučují před zahájením anestezie ověřit hodnoty SpO_2 na obou místech.

2017 Postgraduate Assembly in Anesthesiology (abstract P-9011).

UCSD ULTRASOUND

Vynikající volně přístupné webové stránky pro zájemce o výuku ultrazvuku.

<http://emultrasound.sdsc.edu>

VĚTŠINA POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ NEMÁ PROTEKTIVNÍ VLIV NA SRDCE VYJMA...

Metaanalýza prokazuje určitý efekt pouze u kyseliny listové v prevenci kardiovaskulárních onemocnění a efekt kombinace kyseliny listové / vitaminu B v prevenci ischemické cévní mozkové příhody. Žádný protektivní efekt nebyl nalezen při používání multivitaminů, vitaminů C a D, betakarotenu, kalcia nebo selenu.

J Am Coll Cardiol. 2018;71:2570–2584. doi: 10.1016/j.jacc.2018.04.020.

MNEMONICKÁ POMŮCKA PRO ZAPAMATOVÁNÍ PŘÍČIN KŘEČÍ

SICK DRIFTER

S = substrates (substráty glukóza, kyslík)

I = isoniazid (předávkování izoniazidem)

C = cations (kationty Na, Ca, Mg)

K = kids (eklampsie)

D = drugs (farmaka)

R = rum (syndrom z odnětí alkoholu)

I = illnesses (chronická křečová onemocnění - epilepsie)

F = fever (teplota)

T = trauma (epidurální, subdurální, intraparenchymatózní krvácení)

E = extra (intoxikace)

R = rat poison (organofosfáty)

Do redakce došlo dne 2. 7. 2018.

Do tisku přijato dne 3. 7. 2018.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
cernyvla1960@gmail.com